

تریکومونیازیس

Trichomoniasis

تریکوموناس واژینالیس (vaginalis Trichomonas) انگلی تک یاخته است که موجب بروز نوعی بیماری آمیزشی به نام تریکومونیازیس میشود این بیماری عموماً با نام (تریک) شناخته میشود. این عفونت ممکن است در واژن یا مجرای ادراری بروز کند. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت شیوع تریکوموناس واژینالیس بیش از ۲۸۲/۴ میلیون مورد بیمار جدید در هر سال برآورد گردیده است. انسان تنها میزبان شناخته شده این انگل است که فقط به شکل تروفوزوئیت زندگی میکند و هنگام مقاربت از فرد آلوده به فرد دیگر منتقل میگردد. واژنیت تریکومونایی بعد از واژنیت باکتریایی در مرتبه دوم قرار دارد. این انگل در واژن زنان بخصوص در قسمت سرویکس، و در مجاری اورتر و غده پروستات مردان زندگی میکند.

نحوه ی انتقال بیماری:

رابطه واژنی - مقعدی - دهانی با فرد آلوده به انگل تریکومونیازیس

علائم بالینی بیمار:

ممکن است فرد با وجود ابتلا به تریکومونیازیس، علائمی نداشته باشد.

علائم در زنان:

- تغییر در مقدار - رنگ (ترشحات سفید مایل به زرد) - بو ترشحات واژنی
- سوزش و خارش شدید اندام تناسلی
- سوزش ادرار
- سوزش شدید در هنگام رابطه جنسی

علائم بالینی در مردان:

- ترشحات غیر معمول از آلت تناسلی
- سوزش ادرار
- خارش مجاری ادراری

عوارض احتمالی بیماری :

در مردان:

اگر تریکومونیاژیس به موقع درمان شود، هیچ مشکل ماندگاری ایجاد نخواهد کرد. در مردان، این بیماری ممکن است با ناباروری یا کم شدن مقدار اسپرم ها مرتبط باشد.

در خانم های باردار :

اگر باردار هستید و دچار تریکومونیاژیس شده اید، نوزاد شما ممکن است زودتر از موعد به دنیا بیاید (نارس) و/یا وزن او موقع تولد کم باشد.

همچنین این بیماری احتمال بیشتر آلوده شدن به HIV- سایر بیماری های آمیزشی مسری و انتقال آنها و نیز افزایش خطر ابتلا به بیماری التهابی لگن (PID) در ارتباط است .

درمان :

معمولا با قرص آنتی بیوتیک به نام مترونیدازول درمان میشود. شرکای جنسی مربوط به دوره زمانی ۲ ماه گذشته نیز به درمان نیاز دارند. اگر در ۲ ماه گذشته شریک جنسی نداشته اید، در این صورت آخرین شریک جنسی شما به درمان نیاز دارد از بین رفتن بیماری در بدن شما مدتی به طول خواهد انجامید، به همین خاطر مهم است که طی ۷ روز پس از اینکه شما و شریک(های) جنسی تان درمان با آنتی بیوتیک را شروع کردید، هیچ نوع رابطه جنسی دهانی، واژنی یا مقعدی نداشته باشید .

چگونه میتوان از ابتلا به بیماری جلوگیری کرد :

- استفاده از کاندوم در زمان رابطه جنسی

• اطلاع از وضعیت جسمانی با آزمایشات چکاپ

<https://www.cdc.gov/std/trichomonas/default.htm>

ساغر ذاکری-واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

آزمایشگاه نوبل